



Praktijkprikkel 2021-11

Praktijkprikkel Verwisseling estradiol/norethisteron 2 mg/1 mg

Twee geneesmiddelen die wat samenstelling betreft sterk op elkaar lijken, kunnen bij verwisseling gevolgen hebben voor de patiënt. Dat blijkt uit de volgende melding.

Melding

De urogynaecoloog schrijft aan een vrouw estradiol/norethisteron 2 mg/1 mg voor. Het gebruik is eenmaal daags een tablet. Er staat geen merknaam op het recept. Tijdens de receptverwerking heeft de apothekersassistente de keuze tussen Trisequens[®] of Kliogest[®]. De apothekersassistente kiest voor Trisequens[®] en levert dit af. Bij een vervolgspraak bij de urogynaecoloog geeft de vrouw aan doorbraakbloedingen te hebben. De urogynaecoloog constateert dat de vrouw Trisequens[®] in plaats van Kliogest[®] heeft gebruikt.

Analyse

Er zijn drie estradiol/norethisteron bevattende geneesmiddelen in de handel. Naast de in de melding genoemde Trisequens[®] en Kliogest[®] bestaat er ook Activelle[®]. Hoewel de drie geneesmiddelen die bij overgangsklachten en ter preventie van postmenopauzale osteoporose worden gebruikt op elkaar lijken, zijn er ook enige verschillen (zie onderstaande tabel).

	Trisequens [®]	Kliogest [®]	Activelle [®]
Indicatie overgangsklachten	Overgangsklachten bij vrouwen die ten minste 6 maanden geen menstruatie meer hebben gehad.	Overgangsklachten bij vrouwen die ten minste 1 jaar geen menstruatie meer hebben gehad.	Overgangsklachten bij vrouwen die ten minste 1 jaar geen menstruatie meer hebben gehad.
Prescriptiecode (PRK) en generieke productcode (GPK)	Estradiol/norethisteron tab (Trisequens)	Estradiol/norethisteron tablet 2/1mg	Estradiol/norethisteron tablet omhuld 1/0,5 mg
Verpakkings-inhoud	Een ronde strip met 12 blauwe tabletten (estradiol 2 mg), 10 witte tabletten (estradiol 2 mg en norethisteronacetaat 1 mg) en 6 rode tabletten (estradiol 1 mg).	Een ronde strip met 28 witte tabletten (estradiol 2 mg en norethisteronacetaat 1 mg).	Een ronde strip met 28 witte tabletten (estradiol 1 mg en norethisteronacetaat 0,5 mg).
Innameschema	Cyclus van 28 dagen: Gedurende 12 dagen eenmaal per dag een blauwe tablet. Vervolgens gedurende 10 dagen 1 witte tablet. Daarna gedurende 6 dagen 1 rode tablet.	Cyclus van 28 dagen: Eenmaal per dag een tablet.	Cyclus van 28 dagen: Eenmaal per dag een tablet.

Indien deze geneesmiddelen op generieke naam worden voorgeschreven, kan verwarring over het bedoelde geneesmiddel ontstaan. Als de voorschrijver het juiste geneesmiddel voorschrijft en de apotheek het elektronisch voorgeschreven recept automatisch kan inlezen in het AIS zal geen probleem ontstaan. Verwerkt de apotheekmedewerker het recept handmatig in het AIS dan kan dat wel gebeuren omdat niet altijd alle essentiële gegevens in het computerscherm of op het uitgeprinte recept zichtbaar zijn. Soms is slechts een deel van de generieke naam van het product zichtbaar.



Aanbevelingen

Voor apothekers

- Bespreek met het team de verschillen in samenstelling en effect tussen de drie geneesmiddelen. Bespreek ook dat als achter de generieke naam de sterkte 2/1 mg is vermeld Kliogest® wordt bedoeld, als achter de generieke naam de sterkte 1/0,5 mg is vermeld Activelle wordt bedoeld en als achter de generieke naam Trisequens tussen haakjes is vermeld Trisequens® wordt bedoeld. Geef ook aan dat het team erop bedacht moet zijn dat op het computerscherm of op het uitgeprinte recept een deel van de naam en/of sterkte kan zijn weggefallen.
- Vermeld in het AIS bij Trisequens®, Kliogest® en Activelle® dat bij handmatig te verwerken recepten, waarbij het niet duidelijk is of Trisequens®, Kliogest® of Activelle® wordt bedoeld, contact moet worden opgenomen met de voorschrijver.
- Controleer de recepten van estradiol/norethisteron aan de hand van de merknaam.

Voor apothekersassistenten

- Neem bij handmatig te verwerken recepten, waarbij het niet duidelijk is of Trisequens®, Kliogest® of Activelle® wordt bedoeld, contact op met de voorschrijver.

Voor voorschrijvers

- Zorg voor de vermelding van zowel de generieke naam als de merknaam op het recept bij voorschrijven van combinatiepreparaten met estradiol en norethisteron. Deze zijn alleen verkrijgbaar als merkgeneesmiddel. Indien merknamen automatisch naar generiek omgezet worden, neem dan de merknaam op in het notitieveld.

Interessante informatie?

Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen?

Meer weten over het IVM?

Stuur deze Praktijkprikkel door naar een collega.

Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen?

Meld je dan aan op onze [website](#).

Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal, nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze [nieuwsbrief](#).