

Samenvatting

Monitor Voorschrijven Huisartsen

Themarapportage Diabetes mellitus type 2 2024

Voor de behandeling van DM2 zijn diverse geneesmiddelen beschikbaar. De laatste jaren zijn er diverse wijzigingen geweest in de richtlijnen voor het voorschrijven van deze middelen.

De medicamenteuze behandeling van DM2 is o.a. afhankelijk van het risico op HVZ

Stappenplan niet-kwetsbare patiënten met zeer hoog risico op HVZ

1. SGLT2-remmer
2. Metformine
3. GLP1-agonist

Stappenplan overige patiënten zonder zeer hoog risico op HVZ

1. Metformine
2. Gliclazide (sinds eind 2024 eventueel SGLT2-remmer of GLP1-agonist)

THERAPIEKEUZE step 1 van de behandeling

Metformine meest gekozen bij patiënten zonder en met zeer hoog risico.



Zonder zeer hoog risico:


metformine	76%	SGLT2-remmer	6%
GLP1-agonist	13%	overig	4%



Met zeer hoog risico:

metformine	47%	SGLT2-remmer	41%
GLP1-agonist	6%	overig	5%

Regionale variatie in voorschrijven SGLT2-remmers bij zeer hoog risico



In diverse stedelijke gebieden in de Randstad gebruikt minder dan de helft van de patiënten met zeer hoog risico een SGLT2-remmer, in Limburg meer dan **60%**

Onderbehandeling SGLT2-remmers

Ongeveer de helft van de patiënten met zeer hoog risico gebruikt een SGLT2-remmer.

Dit is een stijging van **10%** t.o.v. 2023.

