



Praktijkprikkel 2021-18

Praktijkprikkel Belang van afgeleide contra-indicatie bij de medicatiebewaking

Het bewaken van de medicatie op basis van de afgeleide contra-indicatie (CI) is nuttig voor apotheken omdat in de praktijk niet altijd de relevante CI's bekend zijn. Dit blijkt uit de volgende melding.

Melding

Een medisch specialist schrijft ofloxacin voor aan een patiënt die lacosamide (Vimpat®) voor epilepsie gebruikt. De apothekersassistent levert ofloxacin af maar wijst de patiënt er niet op dat hij een verhoogd risico heeft op epileptische aanvallen. De patiënt start met het gebruik van ofloxacin en krijgt een epileptische aanval.

Analyse

In de openbare apotheek verscheen er na het verwerken van het recept voor ofloxacin geen CI-signaal 'epilepsie-chinolonen' ondanks het feit dat lacosamide alleen de indicatie epilepsie heeft. Dit signaal verscheen niet, omdat de apotheker vanwege de grote aantallen vals-positieve bewakingssignalen het genereren van de afgeleide CI voor de hele groep 'overige anti-epileptica' had uitgezet. De apotheker ging ervan uit dat de meeste geneesmiddelen in deze groep zijn geïndiceerd voor andere indicaties dan epilepsie, dan wel dat de patiënt ook een anti-epilepticum uit een andere groep krijgt. Het was de apotheker bij de dagelijkse controle van de recepten niet opgevallen dat aan een patiënt die lacosamide gebruikt, ofloxacin was afgeleverd.

Aanbevelingen

Voor apothekers:

- Houd om niet-relevante signalen te voorkomen de vast te leggen CI's per patiënt actueel. In het FTO kunnen zorgverleners, bij onderwerpen waar geneesmiddelen met afgeleide CI eerste keus zijn, afspraken maken over hoe hiermee om te gaan.
- Onderdruk niet het tonen van een afgeleide CI.

Voor huisartsen:

- Zorg dat een medische voorgeschiedenis niet alleen uit de episodelijst volgt. Leg daarnaast omwille van de systematische medicatiebewaking de diagnoses ook vast als CI's.

Voor softwareleveranciers:

- Zorg dat bij geneesmiddelen waaraan een afgeleide CI is gekoppeld, eerst aan de zorgverlener wordt gevraagd of de afgeleide CI moet worden vastgelegd voor die specifieke patiënt. Als de afgeleide CI wordt vastgelegd, moet deze herkenbaar zijn als afgeleide CI.
- Bied de mogelijkheid om vast te leggen wanneer een mogelijk afgeleide CI bij een specifieke patiënt geen CI is.