



Praktijkprikkel Onjuiste omzetting Calci Chew D3®

Deze Praktijkprikkel is met name interessant voor zorgprofessionals werkzaam in of voor ouderenzorginstellingen, gehandicaptenzorginstellingen en GGZ-instellingen

Communicatie blijft een belangrijk punt bij de verwerking van medicatieopdrachten, zo blijkt ook uit de volgende melding.

Melding

Een patiënt in een verpleeghuis heeft een voedingssonde vanwege ernstige slikstoornissen. De logopedist adviseert ook de medicatie via de voedingssonde toe te dienen. De specialist ouderengeneeskunde, apotheker en verpleegkundige betrekken het advies van de logopedist in de medicatiereview. De apotheker adviseert onder andere de Calci Chew D3® kauwtabletten (500 mg/800 IE) om te zetten in Cad® bruisgranulaat (500 mg/880 IE). De specialist ouderengeneeskunde past de medicatie hierop aan in het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) en vermeldt in de medicatieopdracht dat de toediening van het Cad® bruisgranulaat via de sonde moet gebeuren. De apothekersassistent ziet bij het verwerken van de medicatieopdrachten, dat Cad® niet op voorraad is en zet het bruisgranulaat terug naar Calci Chew D3® kauwtabletten die wel voorradig zijn. Dit geneesmiddel is volgens [Oralia VTGM](#) via de sonde toe te dienen. De assistent vergeet op de toedienlijst te vermelden dat de kauwtabletten geschikt moeten worden gemaakt voor toediening per sonde. Hierdoor komen de kauwtabletten automatisch als orale medicatie op de toedienlijst te staan. Door het ontbreken van de toedieninformatie voor de sonde, geeft de verzorgende van het verpleeghuis de Calci Chew D3® niet via de sonde.

Analyse

In deze melding zijn verschillende stappen in het medicatieproces niet goed gegaan:

1. De apothekersassistent signaleerde niet dat door te substitueren de patiënt de Calci Chew D3® kauwtabletten blijft gebruiken, terwijl de apotheker bewust de specialist ouderengeneeskunde had geadviseerd Cad® bruisgranulaat voor te schrijven. De reden voor dit advies was dat het geschikt maken van de kauwtabletten voor toediening via een sonde erg bewerkelijk is. De tabletten zijn lastig te malen en het oplossen in een spuit duurt enkele minuten.
2. De apothekersassistent vergat de wijze van toedienen van de kauwtabletten aan te passen na omzetting, waardoor deze als orale medicatie op de toedienlijst zijn blijven staan.
3. De voorschrijver had de contra-indicatie 'sonde' of 'slikstoornis/slikprobleem' niet bij de patiëntgegevens ingevoerd in het EVS of de apotheker had niet gezien dat bij deze patiënt een van deze contra-indicaties was ingevoerd. Hierdoor miste de apotheker het signaal dat moest worden gecontroleerd of alle medicatie die de patiënt kreeg geschikt was om toe te dienen via de sonde.

Aanbevelingen

Voor de commissie die zich met medicatieveiligheid bezighoudt

Maak duidelijke afspraken wie de contra-indicatie voor een sonde/slikprobleem in het EVS noteert en bijhoudt.

Voor voorschrijvers

- Informeer de apotheek wanneer een patiënt medicatie uitsluitend via een voedingssonde kan innemen.
- Voeg de contra-indicatie 'sonde' of 'slikstoornis/slikprobleem' toe in het EVS bij betreffende patiënten.
- Vermijd het gebruik van notities in medicatieopdrachten als manier van overdracht van essentiële informatie die voor de gehele medicatie van de patiënt geldt.
- Overleg bij twijfel of onduidelijkheid over medicatiegebruik bij patiënten met een sonde of slikproblemen altijd met de apotheker.

Voor apothekers en apothekersassistenten

- Herstart alleen gestopte geneesmiddelen als de reden voor stoppen het toelaat óf als je toestemming van de voorschrijver hebt.
- Controleer of de contra-indicatie 'sonde' of 'slikstoornis/slikprobleem' is ingevoerd bij patiënten met een voedingssonde of als een voorschrijver vanwege de voedingssonde om advies vraagt. Zo niet, attendeer de voorschrijver hierop.
- Controleer bij patiënten met een contra-indicatie 'sonde' of 'slikstoornis/slikprobleem' aan de hand van [Oralia VTGM](#) of de voorgeschreven medicatie via de sonde kan worden toegediend.
- Controleer of de toedienlijst de juiste en volledige informatie bevat.
- Wees extra alert op wijzigingen in de farmacotherapie bij kwetsbare patiëntengroepen, zoals patiënten met een voedingssonde.

Voor verpleegkundigen, verzorgenden en begeleiders

Overleg bij twijfel of onduidelijkheid rondom medicatiegebruik bij patiënten met een sonde of slikproblemen altijd met de apotheker.

Wist je dat?

Je op [de website](#) een compleet overzicht van alle Praktijkprikkel(s) kan vinden. Ben je op zoek naar een Praktijkprikkel over een specifiek onderwerp? Vul bij 'Zoek op onderwerp' je zoekterm in en vind zo de bijbehorende Praktijkprikkel(s).

Zelf deze Praktijkprikkel ontvangen?

Is deze Praktijkprikkel doorgestuurd en wil je deze ook ontvangen? Meld je dan aan op onze [website](#).

Medicatie-incidenten melden?

Wil je een medicatie-incident melden, dan kan dat via onze [website](#).

Meer weten over het IVM?

Informatie over e-learnings, nascholingen, FTO-werkmateriaal, nieuwe geneesmiddelen en ander belangrijk nieuws over medicatieveiligheid? Schrijf je dan in voor onze [nieuwsbrief](#).