

Samenvatting

Monitor Voorschrijven Huisartsen



Themarapportage Medicatieveiligheid 2025

Geneesmiddelen kunnen naast het beoogde effect, ook nadelige consequenties hebben met soms verstrekende gevolgen. Ze kunnen onder andere leiden tot fracturen en bloedingen.





In 2025 gebruikte **15,5%** van de geneesmiddelgebruikers van 65 jaar en ouder middelen uit twee of meer valrisicoverhogende geneesmiddelgroepen. Dit zijn ongeveer **450.000** ouderen.

Het aantal patiënten dat twee trombozytenaggregatieremmers (DAPT) naast elkaar gebruikt, daalt. Nog steeds gebruikt 5 tot 7% van deze patiënten de combinatie langer dan de aangeraden 12 maanden. De regionale spreiding is groot. Deze ligt tussen de 1,9 en 9,9%.



Slechts de helft van de chronisch systemisch glucocorticoïdgebruikers van 50 jaar en ouder kreeg in 2025 medicatie voor fractuurpreventie. Tussen regio's bestaan hierin grote verschillen. Dit verschilt van minder dan 35% tot iets minder dan 85%.



Triple therapie met antitrombotica **langer dan 1 maand** is een zeldzaamheid.

Dit is in lijn met nieuwe Europese richtlijn die adviseert **hooguit 30 dagen** triple therapie voor te schrijven.

Aanbevelingen

- Blijf alert op het gebruik van valrisicoverhogende middelen bij ouderen.
- Ga in regio's die zwak scoren op het voorschrijven van fractuurpreventie bij systemisch corticosteroïdgebruik en/of zwak scoren op het tijdig stoppen van DAPT actief aan de slag met deze thema's.