



Praktijkprikkel verwisseling tussen Fraxiparine® en Fraxiparine Forte®

In 2011 heeft de voorloper van het Portaal op basis van 689 meldingen een nieuwsbrief verzonden over het risico op verwisselingen tussen Fraxiparine® en Fraxodi®. Beide geneesmiddelen bevatten nadroparine. Om de kans op verwisseling te verminderen is in april 2019 de naam Fraxodi® veranderd in Fraxiparine Forte®. In de periode april 2019 tot en met september 2020 ontving het Portaal 7 meldingen over verwisselingen tussen Fraxiparine® en Fraxiparine Forte®.

Casus

Een patiënt heeft een geplande OK opname, waarbij een paar dagen voor de operatie de patiënt therapeutisch met Fraxiparine® moet worden behandeld. Hierbij is door de specialist tweemaal per dag Fraxiparine Forte® voorgeschreven in plaats van tweemaal per dag Fraxiparine® (dus een tweemaal hogere dosering). Het recept is vervolgens naar de huisarts verstuurd, zodat de patiënt vanuit zijn eigen apotheek Fraxiparine Forte® kon ophalen. De assistente van de huisarts vond de dosering zeer hoog. De huisarts heeft hier niets meegedaan omdat hij dacht dat de specialist bewust een hoge dosering had gekozen. Ook de openbare apotheek had gemist dat de dosering te hoog was. De patiënt heeft tweemaal per dag Fraxiparine Forte® gebruikt. Dit heeft geleid tot een ziekenhuisopname vanwege een bloedingscomplicatie.

Analyse

G-Standaard

Geneesmiddelen worden op drie verschillende niveaus in de G-Standaard vermeld, namelijk op HPK-, PRK- en GPK-niveau. Voor het voorschrijven op stofnaam is de PRK (prescriptiecode) bedoeld, voor het afleveren in de apotheek de HPK (handelsproductcode). In de tabel hieronder is de 0,6 ml injectiespuit als voorbeeld genomen om de verschillen in naamgeving, zoals deze in de G-Standaard worden vermeld, weer te geven.

HPK-naam	PRK-naam	GPK-naam
FRAXIPARINE FORTE INJV 11400IE/0,6ML(19000IE/ML)WW	<u>NADROPARINE INJVL WWSP</u> <u>11400IE=0,6ML (19000IE/ML)</u>	NADROPARINE INJVLST 19000IE/ML
FRAXIPARINE INJVLST 5700IE/0,6ML (9500IE/ML) WWSP	<u>NADROPARINE INJVL WWSP</u> <u>5700IE=0,6ML (9500IE/ML)</u>	NADROPARINE INJVLST 9500IE/ML

Als artsen tijdens het voorschrijven het geneesmiddel selecteren op basis van het aantal milliliters, is gezien de kleine verschillen tussen de naamgeving een fout snel gemaakt. In de apotheek kan deze fout zich ook voordoen.

Aanbevelingen

Voor voorschrijvers

- Schrijf nadroparine (Fraxiparine® of Fraxiparine Forte®) voor op basis van eenheden (en dus niet op basis van volume). Het aantal eenheden hangt af van de indicatie, gewicht en nierfunctie van de patiënt.
- Negeer nooit een 'niet-pluis-gevoel' en zeker niet voor een geneesmiddel als nadroparine.

Voor apothekers

- Schrijf nadroparine in het apotheekinformatiesysteem aan op basis van eenheden.
- Negeer nooit een 'niet-pluis-gevoel' en zeker niet voor een geneesmiddel zoals nadroparine. Neem bij twijfel altijd contact op met de voorschrijver.