


Monitor Opioiden

tweede lijn

Tussen 2019 en 2021 schreven de artsen in de 15 deelnemende ziekenhuizen tijdens bijna 1 miljoen behandelingen pijnstillers voor. Aan 52% van de patiënten schreven ze opioïden voor, meestal naast andere pijnstillers, zoals paracetamol of nietsteroidale anti-inflammatoire middelen (NSAID's). Vooral volwassen patiënten die een operatieve ingreep ondergingen, kregen opioïden voorgeschreven. De snijdende specialismen heekunde en orthopedie zijn dan ook de specialismen die het vaakst opioïden voorschreven.

Ontsteking van keel- of neusamandelen nader in beeld




Bij vijf diagnoses, waaronder de diagnose ontsteking van keel- of neusamandelen, werd het voorschrijven van opioïden bij 15 ziekenhuizen in meer detail onderzocht. **42%** van de patiënten kreeg minimaal één voorschrift voor opioïden, meestal gecombineerd met andere analgetica, zoals paracetamol, metamizol en NSAID's. Patiënten van 14 jaar en jonger kregen veel minder vaak een opioïd voorgeschreven dan patiënten van 15 jaar en ouder.

ONTSTEKING VAN KEEL- OF NEUSAMANDELEN NADER IN BEELD




Tussen ziekenhuizen bestaan flinke verschillen. Het percentage patiënten met een opioïde varieerde tussen **12** en **93%**. Tussen **3** en **46%** van de patiënten krijgt een recept voor opioïden voor thuis (extramuraal opioïden). De mediane behandelduur met opioïden varieerde tussen de ziekenhuizen van 1 tot 7 dagen.

Figuur 1. Voorgeschreven pijnstillers bij patiënten met een ontsteking van keel- of neusamandelen



Figuur 2. Voorgeschreven opioïden voor gebruik intra- en extramuraal bij patiënten met een ontsteking van keel- of neusamandelen



In de figuren staat elke balk voor een ziekenhuis. De volgorde waarin de ziekenhuizen zijn weergegeven kunnen per figuur wisselen. De ziekenhuizen met een * hebben een afwijkend patroon qua leeftijdsverdeling of verdeling over zorgtrajecten.

>>

Monitor Opioiden

tweede lijn

<<


ONTSTEKING VAN KEEL- OF NEUSAMANDELEN NADER IN BEELD

Bij vijf diagnoses waaronder de diagnose ontsteking van keel- of neusamandelen werd het voorschrijven van opioiden bij 15 ziekenhuizen in meer detail onderzocht. Deze en andere bevindingen zijn te vinden in het [rapport Monitor Opioiden tweede lijn](#).




Diagnoses nader bekeken


Vijf diagnoses die veel voorkomen zijn nader onderzocht. Dit waren heupfracturen, galblaasaandoeningen, ontstekingen van keel- of neusamandelen, borstkanker en knie-artrose. Bij alle diagnoses schreven artsen aan vrijwel alle patiënten met een recept voor opioiden ook andere pijnstillers voor. Monotherapie met opioiden was zeldzaam. Dit is in lijn met aanbevelingen uit diverse richtlijnen.




knie-artrose




ontstekingen keel- of neusamandelen



borstkanker



galblaas-aandoeningen



heupfracturen

Het rapport Monitor Opioiden tweede lijn maakt onderdeel uit van het project Monitor opioiden tweede lijn, uitgevoerd door het IVM en LOGEX. Het onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van VWS.

Kijk voor meer informatie op: www.ivm.nl/voorschrijfgedrag